がん種	番号	レジメン名称	リンク
大腸癌	08001	FOLFIRI	シート
大腸癌	08002	m-FOLFOX6	シート
大腸癌	08007	sLV5FU2	シート
大腸癌	08012	アバスチン+FOLFIRI	シート
大腸癌	08013	5 mg/kg Beva＋m-FOLFOX6	シート
大腸癌	08016	AVASTIN＋sLV5FU2	シート
大腸癌	08019	アービタックス＋カンプト毎週投与法	シート
大腸癌	08020	アービタックス＋カンプト隔週投与法	シート
大腸癌	08021	アービタックス単剤投与法	シート
大腸癌	08023	FOLFILI+アービタックス	シート
大腸癌	08024	m-FOLFOX6+Cetu	シート
大腸癌	08027	XELOX＋Bevacizumab	シート
大腸癌	08028	XELOX	シート
大腸癌	08029	ゼローダ＋Bevacizumab	シート
大腸癌	08032	ベクティビックス単剤	シート
切除不能大腸癌	08038	IRIS	シート
大腸癌	08040	m-FOLFOX6＋Panitumumab	シート
大腸癌	08041	SOX＋Bevacizumab	シート
大腸癌	08042	Pmab+FOLFIRI	シート
大腸癌	08043	bi-weekly CPT-11	シート
大腸癌	08044	bi-weekly CPT-11＋Bevacizumab	シート
大腸癌	08045	bi-weekly CPT-11＋Panitumumab	シート
大腸癌	08047	Bev＋ロンサーフ	シート
大腸癌	08048 08049	XELOX＋Cetuximab	シート
切除不能大腸癌	08050	IRIS+BV	シート
大腸癌	08051	サイラムザ+FOLFIRI	シート
大腸癌	08052	UFT/LV＋Bevacizumab	シート
大腸癌	08057	m-FOLFOXIRI＋Bev	シート
大腸癌	08058	SOX	シート
大腸癌	08059	Aflibercept＋FOLFIRI	シート
大腸癌	08060	XELIRI+Bev	シート

大腸癌	08061	Biweeklyアービタックス+FOLFIRI	シート
大腸癌	08062 08063	ERBITUX+CPT-11biweekly	シート
MSI-high 大腸癌	08064	オプジーボ(240mg固定)	シート
MSI-high 大腸癌	08065	オプジーボ(480mg固定)	シート
MSI-high 大腸癌	08066	ヤーボイ+オプジーボ	シート
BRAF陽性大腸癌	08068	BEACON CRC Cmab	シート
小腸癌(十二指腸癌)	08069	S-1+L-OHP(SOX)	シート
大腸癌	08070	初回　HER＋PER 療法	シート
大腸癌	08071	2回目以降HER＋PER 療法	シート
大腸癌	08072	Biweeklyアービタックス+mFOLFOX6	シート
大腸癌	08073	【臨】CAPOXIRI(1コース3週)	シート
大腸癌	08074	Enco+Cetu+mFOLFOX6(1コース2週)	シート
大腸癌	08075	ソトラシブ+Pani(1コース2週)	シート
小腸癌	09002	m-FOLFOX6	シート
肛門扁平上皮癌	09904	カペシタビン+MMC 放射線併用	シート

レジメン名	Biweeklyアービタックス+mFOLFOX6	レジメンNo.	08072

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	500 mg/m^2	day1
オキサリプラチン	85 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	2回目以降HER+PER	レジメンNo.	8071

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	420 mg/body	day1
トラスツズマブ	6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	初回用HER+PER	レジメンNo.	8070

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペルツズマブ	840 mg/body	day1
トラスツズマブ	8 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	FOLFIRI	レジメンNo.	08001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン	150 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	m-FOLFOX6	レジメンNo.	08002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
オキサリプラチン	85 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	sLV5FU2	レジメンNo.	08007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	アバスチン+FOLFIRI	レジメンNo.	08012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1
イリノテカン	150 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	5 mg/kg Beva＋m-FOLFOX6	レジメンNo.	08013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1
オキサリプラチン	85 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	AVASTIN＋sLV5FU2	レジメンNo.	08016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	アービタックス＋カンプト毎週投与法	レジメンNo.	08019

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	42日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	初回400 mg/m^2 2回以降250 mg/m^2	day1,8,15,22,29,36
イリノテカン	100 mg/m^2	day1,8,15,22

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	アービタックス＋カンプト隔週投与法	レジメンNo.	08020

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	49日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	初回400 mg/m^2 2回以降250 mg/m^2	day1,8,15,22,29,36,43
イリノテカン	150 mg/m^2	day1,15,29

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	アービタックス単剤投与法	レジメンNo.	08021

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	7日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	初回400 mg/m^2 2回以降250 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	FOLFILI+アービタックス	レジメンNo.	08023

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	初回400 mg/m^2 2回以降250 mg/m^2	day1,8
イリノテカン	150 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	m-FOLFOX6+Cetu	レジメンNo.	08024

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	初回400 mg/m^2 2回以降250 mg/m^2	day1,8
オキサリプラチン	85 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	XELOX＋Bevacizumab	レジメンNo.	08027

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
カペシタビン	1000 mg/m^2 x 2回/日	day1-14
オキサリプラチン	130 mg/m^2	day1
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

XELOXにおけるゼローダ体表面積あたりの通常投与量

体表面積	1回用量	日量
1.36㎡未満	1200mg	4T×2
1.36㎡以上1.66㎡未満	1500mg	5T×2
1.66㎡以上1.96㎡未満	1800mg	6T×2
1.96㎡以上	2100mg	7T×2

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	XELOX	レジメン No.	08028

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
カペシタビン	1000 mg/m^2 x 2回/日	day1-14
オキサリプラチン	130 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

XELOXにおけるゼローダ体表面積あたりの通常投与量

体表面積	1回用量	日量
1.36㎡未満	1200mg	4T×2
1.36㎡以上1.66㎡未満	1500mg	5T×2
1.66㎡以上1.96㎡未満	1800mg	6T×2
1.96㎡以上	2100mg	7T×2

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ゼローダ＋Bevacizumab	レジメンNo.	08029

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	21日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
カペシタビン	1000 mg/m^2 x 2回/日	day1-14
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

ゼローダ体表面積あたりの通常投与量

体表面積	1回用量	日量
1.36㎡未満	1200mg	4T×2
1.36㎡以上1.66㎡未満	1500mg	5T×2
1.66㎡以上1.96㎡未満	1800mg	6T×2
1.96㎡以上	2100mg	7T×2

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ベクティビックス単剤	レジメンNo.	08032

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
パニツムマブ	6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	IRIS	レジメンNo.	08038

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
切除不能大腸癌	28日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン	125 mg/m^2	day1,15
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m^2	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

体表面積	初回基準量（テガフール相当量）
1．25m2未満	40mg／回
1．25m2以上～1．5m2未満	50mg／回
1．5m2以上	60mg／回

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	m-FOLFOX6＋Panitumumab	レジメンNo.	08040

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
パニツムマブ	6 mg/kg	day1
オキサリプラチン	85 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	SOX＋Bevacizumab	レジメンNo.	08041

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m^2	day1-14
オキサリプラチン	130 mg/m^2	day1
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

体表面積	初回基準量（テガフール相当量）
1．25m2未満	40mg／回
1．25m2以上～1．5m2未満	50mg／回
1．5m2以上	60mg／回

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Pmab+FOLFIRI	レジメンNo.	08042

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
パニツムマブ	6 mg/kg	day1
イリノテカン	150 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	bi-weekly CPT-11	レジメンNo.	08043

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン	150 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	bi-weekly CPT-11＋Bevacizumab	レジメンNo.	08044

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン	150 mg/m^2	day1
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	bi-weekly CPT-11＋Panitumumab	レジメンNo.	08045

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン	150 mg/m^2	day1
パニツムマブ	6 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Bev＋ロンサーフ	レジメンNo.	08047

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	28日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
トリフルリジン チピラシル塩酸塩	35 mg/m^2 x 2回/日	day1-5 day8-12
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

体表面積(m2)	初回基準量 (トリフルリジン相当量)	体表面積(m2)	初回基準量 (トリフルリジン相当量)
1．07未満	35mg／回（70mg／日）	1．69以上～1．84未満	60mg／回（120mg／日）
1．07以上～1．23未満	40mg／回（80mg／日）	1．84以上～1．99未満	65mg／回（130mg／日）
1．23以上～1．38未満	45mg／回（90mg／日）	1．99以上～2．15未満	70mg／回（140mg／日）
1．38以上～1．53未満	50mg／回（100mg／日）	2．15以上	75mg／回（150mg／日）
1．53以上～1．69未満	55mg／回（110mg／日）		

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	XELOX＋Cetuximab	レジメンNo.	08048 08049

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
カペシタビン	1000 mg/m^2 x 2回/日	day1-14
オキサリプラチン	130 mg/m^2	day1
セツキシマブ	初回400 mg/m^2 2回以降250 mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

XELOXにおけるゼローダ体表面積あたりの通常投与量

体表面積	1回用量	日量
1.36㎡未満	1200mg	4T×2
1.36㎡以上1.66㎡未満	1500mg	5T×2
1.66㎡以上1.96㎡未満	1800mg	6T×2
1.96㎡以上	2100mg	7T×2

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	IRIS+BV	レジメンNo.	08050

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
切除不能大腸癌	28日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン	100 mg/m^2	day1,15
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m^2	day1-14
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

体表面積	初回基準量（テガフール相当量）
1．25m2未満	40mg／回
1．25m2以上～1．5m2未満	50mg／回
1．5m2以上	60mg／回

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	サイラムザ+FOLFIRI	レジメンNo.	08051

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ラムシルマブ	8 mg/kg	day1
イリノテカン	150 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	UFT/LV＋Bevacizumab	レジメンNo.	08052

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	21日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1
テガフール ウラシル	100 mg/㎡×3回/日	day1-5,8-12,15-19
ホリナートカルシウム	25 mgX3回/日	day1-5,8-12,15-19

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

UFT/ユーゼルまたはロイコボリン錠の減量方法

体表面積	初回基準投与量1日投与量		1段階減量1日投与量		2段階減量1日投与量	
	UFT	ユーゼル or ロイコボリン	UFT	ユーゼル or ロイコボリン	UFT	ユーゼル or ロイコボリン
＜1.17	300	75	200	50	―	―
1.17−1.49	400	75	300	75	200	50
1.5−1.83	500	75	400	75	300	75
＞1.83	600	75	500	75	400	75

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	m-FOLFOXIRI＋Bev	レジメンNo.	08057

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	高度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	5 mg/kg	day1
オキサリプラチン	85 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
イリノテカン	150 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日
アプレピタント	80 mg/日	day2,3

特記事項

レジメン名	SOX	レジメンNo.	08058

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80 mg/m^2	day1夕－15朝
オキサリプラチン	130 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

体表面積	初回基準量（テガフール相当量）
1．25m2未満	40mg／回
1．25m2以上～1．5m2未満	50mg／回
1．5m2以上	60mg／回

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Aflibercept＋FOLFIRI	レジメンNo.	08059

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
アフリベルセプト　ベータ	4 mg/kg	day1
イリノテカン	150 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	XELIRI+Bev	レジメンNo.	08060

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
切除不能大腸癌	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
イリノテカン	200 mg/m^2	day1
カペシタビン	800 mg/m^2 x 2回/日	day1-14
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

ゼローダ投与量

体表面積	1回投与量		
	開始用量	1段階減量	2段階減量
1.26未満	900mg	600mg	-
1.26以上1.31未満		→	600mg
1.31以上1.69未満	1200mg	900mg	
1.69以上1.76未満	1500mg		
1.76以上1.88未満		1200mg	
1.88以上2.07未満			900mg
2.07以上2.26未満	1800mg		
2.26以上		1500mg	

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ERBITUX+CPT-11biweekly	レジメンNo.	08062 08063

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	初回400 mg/m^2 2回以降250 mg/m^2	day1,8
イリノテカン	初回100 mg/m^2 2回目以降150 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	m-FOLFOX6	レジメンNo.	09002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
オキサリプラチン	85 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	カペシタビン+MMC 放射線併用	レジメンNo.	09904

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
肛門扁平上皮癌	56日*	軽度

一般名	標準投与量	投与日
マイトマイシンC	10mg/㎡	day1,29
カペシタビン	825mg/㎡×2回/日	放射線照射日に内服 （5日内服2日休薬）

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

*投薬・放射線治療は5週・休薬3週で合計8週

cape citabin通常投与量

体表面積	1回投与量
1.31㎡未満	900mg
1.31㎡以上1.64㎡未満	1,200mg
1.64㎡以上	1,500mg

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	S-1+L-OHP（SOX）	レジメンNo.	08069

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小腸癌（十二指腸癌）	21日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80-120mg/body/day	day1夕－15朝
オキサリプラチン	100 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

体表面積	初回基準量（テガフール相当量）
1．25m2未満	40mg／回
1．25m2以上～1．5m2未満	50mg／回
1．5m2以上	60mg／回

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Biweeklyアービタックス+FOLFIRI	レジメンNo.	08061

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	500 mg/m^2	day1
イリノテカン	150 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ(240mg固定)	レジメンNo.	08064

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
MSI-high 大腸癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

MSI-High大腸癌の病名は生殖細胞系列の遺伝情報と関係する可能性があり、情報の取り扱いに際しては、遺伝学的情報に関する各種ガイドラインを参照するなど、十分に配慮してください。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ(480mg固定)	レジメンNo.	08065

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
MSI-high 大腸癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

MSI-High大腸癌の病名は生殖細胞系列の遺伝情報と関係する可能性があり、情報の取り扱いに際しては、遺伝学的情報に関する各種ガイドラインを参照するなど、十分に配慮してください。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ヤーボイ+オプジーボ	レジメンNo.	08066

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
MSI-high 大腸癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240mg/body	day1
イピリムマブ	1mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

MSI-High大腸癌の病名は生殖細胞系列の遺伝情報と関係する可能性があり、情報の取り扱いに際しては、遺伝学的情報に関する各種ガイドラインを参照するなど、十分に配慮してください。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	BEACON CRC Cmab	レジメンNo.	08068

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
BRAF陽性大腸癌	7日	軽度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	初回400 mg/m^2 2回以降250 mg/m^2	day1
エンコラフェニブ	300 mg/body×1回/日	day1-7
ビニメチニブ*	45 mg/body x 2回/日	day1-7

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

*ビニメチニブ併用の場合

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CAPOXIRI(1コース3週)	レジメンNo.	08073

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	21日	高度

一般名	標準投与量	投与日
オキサリプラチン	130 mg/m^2	day1
イリノテカン	150 mg/m^2	day1
カペシタビン	1600 mg/m^2 x 2回/日	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

※本レジメンは、術前化学療法として6コース基準

＊ Ccr30～50: カペシタビン1段階減量

カペシタビン投与量	記該当量を1日2回投与する）		
体表面積	開始用量（1,600mg/m2）	1段階減量（1,200mg/m2）	2段階減量（800mg/m2）
1.26未満	900mg	600mg	600mg
1.26以上1.31未満		900mg	
1.31以上1.69未満	1,200mg		
1.69以上1.76未満	1,500mg		
1.76以上1.88未満		1,200mg	
1.88以上2.07未満			900mg
2.07以上2.26未満	1,800mg		
2.26以上		1,500mg	

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Enco+Cetu+mFOLFOX6（1コース2週）	レジメンNo.	08074

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	中等度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	500 mg/m^2	day1
オキサリプラチン	85 mg/m^2	day1
レボホリナートカルシウム水和物	200 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	400 mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400 mg/m^2	day1(46時間持続投与)
エンコラフェニブ	300 mg/body×1回/日	day1-14

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ソトラシブ+Pani療法	レジメンNo.	08075

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
大腸癌	14日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
パニツムマブ	6 mg/kg	day1
ソトラシブ	960 mg	day1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部