がん種	番号	レジメン名称	リンク
膵癌	10001	GEM 療法（1コース4週）	シート
膵癌	10002	Biweekly GEM 療法（1コース4週）	シート
膵癌	10003	GEM 療法（2投1休）（1コース3週）	シート
膵癌	15002	TS-1＋GEM併用療法（1コース6週）	シート
膵癌	15007	m-FOLFIRINOX（1コース2週）	シート
膵癌	15010	GA（1コース4週）	シート
膵癌	15011	GA・1投1休（1コース4週）	シート
膵癌	15012	GA・2投1休（1コース3週）	シート
膵癌	15013	GEM＋TS-1（2投1休）（1コース3週）	シート
膵癌	15015	nal-IRI（1コース2週）	シート
膵癌	15016	S-1+PTX経静脈・腹腔内投与併用療法	シート
膵癌	15017	GA静脈内投与+PTX腹腔内投与併用療法	シート

レジメン名	GEM 療法	レジメンNo.	10001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Biweekly GEM 療法	レジメン No.	10002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/m^2	day1,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GEM 療法（2投1休）	レジメン No.	10003

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/m^2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	TS-1＋GEM併用療法	レジメンNo.	15002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌切除不能例・再発例	42日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン塩酸塩	600～1000mg/m^2	day 1,15,29
ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	60～80mg/m^2	day 1～28

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

体表面積1.25m^2未満：25～40mg/回×2/日

体表面積1.25～1.5m^2未満：40～50mg/回×2/日

体表面積1.5m^2以上：50～60mg/回×2/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	m-FOLFIRINOX	レジメンNo.	15007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌	14日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ水和物	200mg/m^2	day 1
フルオロウラシル	2400mg/m^2	day 1（46時間持続投与）
オキサリプラチン	85mg/m^2	day 1
イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/m^2	day 1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
アプレピタント	80mg	day 2,3

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GA	レジメンNo.	15010

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型	125mg/m^2	day1,8,15
ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GA・1投1休	レジメンNo.	15011

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型	125mg/m^2	day1,15
ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/m^2	day1,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GA・2投1休	レジメンNo.	15012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型	125mg/m^2	day1,8
ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/m^2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GEM＋TS-1（2投1休）	レジメンNo.	15013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/m^2	day1, 8
ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	60mg/m^2	day 1-14

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

体表面積1.25m^2未満：60mg（40mg＋20mg）/日

体表面積1.25～1.5m^2未満：80mg/日

体表面積1.5m^2以上：100mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	nal-IRI	レジメンNo.	15015

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌	14日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ水和物	200mg/m^2	day1
イリノテカン塩酸塩水和物 リポソーム懸濁型	70mg/m^2	day1
フルオロウラシル	2400mg/m^2	day1（46時間持続投与）

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	S-1+PTX経静脈・腹腔内投与併用療法	レジメンNo.	15016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル（静注）	50mg/m^2	day1,8
パクリタキセル（腹腔内）	20mg/m^2	day1,8
ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｷﾞﾒﾗｼﾙ･ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	80mg/m^2	day 1夕食後-15朝食後

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

体表面積1.25m^2未満：80mg/日

体表面積1.25～1.5m^2未満：100mg/日

体表面積1.5m^2以上：120mg/日

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	GA静脈内投与+PTX腹腔内投与併用療法	レジメンNo.	15017

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
膵癌	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型	75mg/m^2	day1,8,15
ゲムシタビン塩酸塩	800mg/m^2	day1,8,15
パクリタキセル	20mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部