がん種	番号	レジメン名称	リンク
原発不明癌　　（小細胞癌・NEC）	16008	CDDP+ETP(1コース3週)	シート
悪性神経膠腫	32005	10mg/kg Bevacizumab(1コース2週)	シート
悪性神経膠腫	32006	15mg/kg Bevacizumab(1コース3週)	シート
悪性神経膠腫	32009	テモゾロミド＋Bevacizumab(1コース4週)	シート
悪性神経膠腫	32013	テモゾロミド（内服）＋Bevacizumab(1コース4週)	シート
全身性強皮症	54014	リツキサン（1コース1週）	シート
MSI-High固形癌	60001	キイトルーダ(1コース3週)	シート
MSI-High固形癌	60002	キイトルーダ(1コース6週)	シート
TMB-High固形癌	60003	キイトルーダ(1コース3週)	シート
TMB-High固形癌	60004	キイトルーダ(1コース6週)	シート
HER2陽性の進行・再発固形癌（胃癌以外	60005	エンハーツ（1コース3週）	シート
異所性小細胞癌	61001	CBDCA+VP-16（1コース3週）	シート
小細胞癌・NEC	61003	CDDP+ETP(1コース3週)	シート
神経内分泌細胞癌	61004	AMR（1コース3週）	シート
皮膚上皮性悪性腫瘍	45013	オプジーボ(1コース4週)	シート
高悪性度骨軟部腫瘍	28006	DTX+GEM（1コース3週）	シート
悪性軟部腫瘍	28019	ハラヴェン（1コース3週）	シート
高悪性度骨軟部腫瘍	28022	ADR（60mg/㎡、day1、1コース3週）	シート
皮膚血管肉腫	40002	weekly Paclitaxel（1コース4週）	シート
皮膚血管肉腫	40006	ハラヴェン（1コース3週）	シート
悪性黒色腫	37010	ヤーボイ（1コース3週）	シート
悪性黒色腫【転移再発】	37011	オプジーボ(1コース2週)	シート
悪性黒色腫	37012	キイトルーダ（1コース3週）	シート
悪性黒色腫	37013	オプジーボ・ヤーボイ（1コース3週）	シート
悪性黒色腫【術後補助療法】	37014	オプジーボ(1コース2週)	シート
悪性黒色腫【術後補助療法】	37015	オプジーボ(1コース4週)	シート
悪性黒色腫【転移再発】	37016	オプジーボ(1コース4週)	シート
悪性黒色腫【術後補助療法】	37017	キイトルーダ（1コース6週）	シート
悪性黒色腫【転移再発】	37018	キイトルーダ（1コース6週）	シート
血栓性血小板減少性紫斑病	50006BS	リツキシマブBS（1コース1週）	シート
胸腺癌	27012	CDDP＋ETP＋RT（1コース4週）	シート
胸腺癌	27013	CBDCA+PTX+テセントリク（1コース3週）	シート
胸腺癌	27014	テセントリク維持療法（1コース3週）	シート
胸腺腫	29008	CDDP＋ETP＋RT（1コース4週）	シート
小児癌	36177	JPLSG-LCH19/多発骨型/維持相Ⅰ+z-bz	シート

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメンNo.	60003

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
TMB-High固形癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ(1コース6週)	レジメンNo.	60004

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
TMB-High固形癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	10mg/kg Bevacizumab	レジメンNo.	32005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性神経膠腫	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	10mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	15mg/kg Bevacizumab	レジメンNo.	32006

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性神経膠腫	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ベバシズマブ	15mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テモゾロミド＋Bevacizumab	レジメンNo.	32009

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性神経膠腫	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
テモゾロミド	1コース目：150mg/㎡ 2コース目以降：200mg/㎡へ増量可	day1-5
ベバシズマブ	10mg/kg	day1, 15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テモゾロミド（内服）＋Bevacizumab	レジメンNo.	32013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性神経膠腫	28日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
テモゾロミド	1コース目：150mg/㎡ 2コース目以降：200mg/㎡へ増量可	day1-5（空腹時）
ベバシズマブ	10mg/kg	day1, 15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメンNo.	60001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
MSI-High固形癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

MSI-High固形癌の病名は生殖細胞系列の遺伝情報と関係する可能性があり、情報の取り扱いに際しては、遺伝学的情報に関する各種ガイドラインを参照するなど、十分に配慮してください。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ(1コース6週)	レジメンNo.	60002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
MSI-High固形癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

MSI-High固形癌の病名は生殖細胞系列の遺伝情報と関係する可能性があり、情報の取り扱いに際しては、遺伝学的情報に関する各種ガイドラインを参照するなど、十分に配慮してください。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+VP-16	レジメンNo.	61001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
異所性小細胞癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
エトポシド	100mg/㎡	day1-3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP+ETP(1ｺｰｽ3週)	レジメンNo.	16008

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
原発不明癌 （小細胞癌・NEC）	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	80mg/㎡	day1
エトポシド	100mg/㎡	day1-3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	8mg/日	day2,3

特記事項

Day１-3はOS-1　１Lの飲水もしくは同等の水分と塩分（3g）を推奨。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP+ETP	レジメンNo.	61003

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小細胞癌・NEC	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	80mg/㎡	day1
エトポシド	100mg/㎡	day1-3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	リツキサン/全身性強皮症	レジメンNo.	54014

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
全身性強皮症	7日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
リツキシマブ	375 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ(1コース4週)	レジメンNo.	45013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
皮膚上皮性悪性腫瘍	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	DTX+GEM（1コース3週）	レジメンNo.	28006

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
高悪性度骨軟部腫瘍	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	75 mg/m^2	day8
ゲムシタビン	900 mg/m^2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ハラヴェン（1コース3週）	レジメンNo.	28019

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性軟部腫瘍	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
エリブリン	1.4 mg/m^2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ADR（60mg/㎡、day1、1コース3週）	レジメンNo.	28022

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
高悪性度骨軟部腫瘍	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
ドキソルビシン	60 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	weekly Paclitaxel（1コース4週）	レジメンNo.	40002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
皮膚血管肉腫	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	60-80 mg/m^2	day1,8,15

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	ハラヴェン（1コース3週）	レジメンNo.	40006

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
皮膚血管肉腫	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
エリブリン	1.4 mg/m^2	day1,8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	ヤーボイ	レジメンNo.	37010

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性黒色腫	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
イピリムマブ	3mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ（1コース2週）	レジメンNo.	37011

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性黒色腫【転移再発】	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメンNo.	37012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性黒色腫	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ・ヤーボイ	レジメンNo.	37013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性黒色腫	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	80mg	day1
イピリムマブ	3mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ（1コース2週）	レジメンNo.	37014

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性黒色腫【術後補助療法】	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ（1コース4週）	レジメンNo.	37015

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性黒色腫【術後補助療法】	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ（1コース4週）	レジメンNo.	37016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性黒色腫【転移再発】	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ（1コース6週）	レジメンNo.	37017

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性黒色腫【術後補助療法】	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ（1コース6週）	レジメンNo.	37018

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性黒色腫【転移再発】	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	リツキシマブBS/血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)	レジメンNo.	50006BS

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
血栓性血小板減少性紫斑病	7日	最小度

一般名	標準投与量	投与日
リツキシマブ	375 mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP＋ETP＋RT（1コース4週）	レジメンNo.	27012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胸腺癌	28日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
エトポシド	100mg/m^2	day1-3
シスプラチン	80mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

放射線併用

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP＋ETP＋RT（1コース4週）	レジメンNo.	29008

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胸腺腫	28日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
エトポシド	100mg/m^2	day1-3
シスプラチン	80mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

放射線併用

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	JPLSG-LCH19/多発骨型/維持相Ⅰ+z-bz	レジメンNo.	36177

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
小児癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ゾレドロン酸水和物	4.0mg/㎡	day1
メトトレキサート	20mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

ZOL投与量：最大4.0mg/day、体重<10kgは0.13mg/kg/day
MTX投与量：体重<10kgは0.7mg/kg/day
PSL投与量：体重<10kgは1.33mg/kg/day
day1～day3：プレドニゾロン　40mg/㎡（max: 60mg）

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	AMR（1コース3週）	レジメンNo.	61004

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
神経内分泌細胞癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
アムルビシン	40mg/㎡	day1-3

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	エンハーツ(1コース3週)	レジメンNo.	60005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
HER2陽性の進行・再発固形癌（胃癌以外）	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
トラスツズマブデルクステカン	5.4mg/kg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA+PTX+テセントリク（1コース３週）	レジメンNo.	27013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胸腺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1200mg	day1
パクリタキセル	200mg/㎡	day1
カルボプラチン	AUC＝6	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	テセントリク維持療法（１コース３週）	レジメンNo.	27014

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
胸腺癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
アテゾリズマブ	1200mg	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部