がん種	番号	レジメン名称	リンク
悪性胸膜中皮腫	17001	CDDP+PEM（1ｺｰｽ3週）	シート
悪性胸膜中皮腫	17002	PEM（1コース3週）	シート
悪性胸膜中皮腫	17003	CBDCA＋PEM（1ｺｰｽ3週）	シート
悪性胸膜中皮腫	17005	DTX（1コース3週）	シート
悪性胸膜中皮腫	17007	GEM（1ｺｰｽ3週）	シート
悪性胸膜中皮腫	17008	オプジーボ（240mg固定_ 1コース2週）	シート
悪性胸膜中皮腫	17009	VNR(1ｺｰｽ3週）	シート
悪性胸膜中皮腫	17010	オプジーボ（480mg固定_ 1コース4週）	シート
悪性胸膜中皮腫	17011	NIV+IPI 奇数C(1ｺｰｽ3週）	シート
悪性胸膜中皮腫	17012	NIV+IPI 偶数C(1ｺｰｽ3週）	シート
悪性胸膜中皮腫	17013	CBDCA＋PEM+キイトルーダ	シート
悪性胸膜中皮腫	17014	CDDP＋PEM＋キイトルーダ	シート
悪性胸膜中皮腫	17015	キイトルーダ維持療法（1コース3週）	シート
悪性胸膜中皮腫	17016	キイトルーダ維持療法（1コース6週）	シート

レジメン名	CDDP+PEM（1ｺｰｽ3週）	レジメンNo.	17001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
シスプラチン	75m g /㎡	day1
ペメトレキセド	500m g /㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	8m g /日	day2,3
葉酸	0.5mg/日	アリムタ開始1週間前から連日（全コース終了後22日目まで）

特記事項

Day１-3はOS-1　１Lの飲水もしくは同等の水分と塩分（3g）を推奨。
Day2,3は飲水などにより尿量1000mL以上確保する。

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	PEM（１コース3週）	レジメンNo.	17002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ペメトレキセド	500mg/m2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5m g /日	アリムタ開始7日前から連日(全コース終了後22日目まで)
デキサメタゾン	8mg/日	day2，3

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA＋PEM（1ｺｰｽ3週）	レジメンNo.	17003

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=6	day1
ペメトレキセド	500mg/m2	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日
デキサメタゾン	8mg/日	day2,3
葉酸	0.5m g /日	アリムタ開始1週間前から連日投与 （全コース終了後22日目まで）

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【転】DTX（1コース3週）	レジメンNo.	17005

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	60mg/m2	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	【転】GEM (1ｺｰｽ3週)	レジメンNo.	17007

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	21日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000ｍｇ/㎡	day１,8

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ（240mg固定_ 1コース2週）	レジメンNo.	17008

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240m g /body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	VNR(1ｺｰｽ3週)	レジメンNo.	17009

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ビノレルビン	25mｇ/㎡	day1,8

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ（480mg固定_ 1コース4週）	レジメンNo.	17010

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480m g /body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	NIV+IPI 奇数C(1ｺｰｽ3週)	レジメンNo.	17011

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	360m g /body	day1
イピリムマブ	1m g /kg	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	NIV+IPI 偶数C(1ｺｰｽ3週)	レジメンNo.	17012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	360m g /body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CBDCA＋PEM+キイトルーダ	レジメンNo.	17013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
カルボプラチン	AUC=5	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	day1
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP＋PEM＋キイトルーダ	レジメンNo.	17014

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1
ペメトレキセド	500mg/m^2	day1
シスプラチン	75mg/m^2	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日
葉酸	0.5mg/日	連日
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3

特記事項

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ維持療法（1コース3週）	レジメンNo.	17015

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

最大2年間

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ維持療法（1コース6週）	レジメンNo.	17016

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
悪性胸膜中皮腫	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

最大2年間

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部