がん種	番号	レジメン名称	リンク
頭頸部癌	35001	Weekly Docetaxel(DTX)	シート
頭頸部癌	35002	Bi-weekly Docetaxel(DTX)	シート
頭頸部癌	35010	Weekly Paclitaxel	シート
頭頸部癌	35012-1 35012	CDDP+5-FU+Cetuximab	シート
頭頸部癌	35013-1 35013	CBDCA+5-FU+Cetuximab	シート
頭頸部癌	35014-1 35014	Cetuximab単剤	シート
頭頸部癌	35018-1 35018	Weekly Cetu+PTX	シート
頭頸部癌	35020	オプジーボ（1コース2週）	シート
頭頸部癌	35023-1 35023	PCE療法	シート
頭頸部癌	35028	キイトルーダ(1コース3週)	シート
頭頸部癌	35029	キイトルーダ(1コース6週)	シート
頭頸部癌	35030	オプジーボ（1コース4週）	シート
頭頸部癌	35035	術前キイトルーダ(1コース3週)	シート
頭頸部癌	35036	術後キイトルーダ(1コース6週)	シート
頭頸部癌	35039	術後RT+キイトルーダ(1コース6週)	シート
頭頸部癌	35040	術前キイトルーダ(1コース6週)	シート

レジメン名	Weekly Docetaxel(DTX)	レジメンNo.	35001

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	25mg/㎡	day1, 8, 15

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Bi-weekly Docetaxel(DTX)	レジメンNo.	35002

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	28日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
ドセタキセル	40mg/㎡	day1, 15

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Weekly Paclitaxel	レジメンNo.	35010

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	49日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
パクリタキセル	100mg/㎡	day1, 8, 15, 22, 29, 36

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	CDDP+5-FU+Cetuximab	レジメンNo.	35012-1 35012

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	21日間	高度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	400mg/㎡(1回目) 250mg/㎡(2回目以降)	day1, 8, 15
シスプラチン	80mg/㎡	day1
フルオロウラシル	800mg/㎡	day1-4

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	CBDCA+5-FU+Cetuximab	レジメンNo.	35013-1 35013

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	21日間	中等度(高度に準ずる)

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	400mg/㎡(1回目) 250mg/㎡(2回目以降)	day1, 8, 15
カルボプラチン	AUC=5	day1
フルオロウラシル	800mg/㎡	day1-4

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	Cetuximab単剤	レジメンNo.	35014-1 35014

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	7日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	400mg/㎡(1回目) 250mg/㎡(2回目以降)	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	Weekly Cetu+PTX	レジメンNo.	35018-1 35018

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	7日間	軽度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	400mg/㎡(1回目) 250mg/㎡(2回目以降)	day1
パクリタキセル	80mg/㎡	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	オプジーボ(1コース2週)	レジメンNo.	35020

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	14日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	240mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	PCE療法	レジメンNo.	35023-1 35023

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	21日間	中等度

一般名	標準投与量	投与日
セツキシマブ	400mg/㎡(1回目) 250mg/㎡(2回目以降)	day1, 8, 15
パクリタキセル	100mg/㎡	day1, 8
カルボプラチン	AUC=2.5	day1, 8

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメンNo.	35028

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	キイトルーダ(1コース6週)	レジメンNo.	35029

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	オプジーボ（1コース4週）	レジメンNo.	35030

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	28日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ニボルマブ	480mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	術前キイトルーダ(1コース3週)	レジメンNo.	35035

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	21日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

StageⅢ、Ⅳの頭頸部癌が対象（cN3b症例、再発病変に対する根治手術症例は対象外）

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	術後キイトルーダ(1コース6週)	レジメンNo.	35036

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

術後RT＋キイトルーダ±CDDP終了後

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	術後RT+キイトルーダ(1コース6週)	レジメンNo.	35039

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法

一般名	標準投与量	投与日

特記事項

術前キイトルーダ投与を実施していること

再発中リスク症例またはシスプラチン不耐症例対象

放射線治療（再発中リスク症例は60Gy、高リスク症例は66Gy、肉眼的残存病変あれば70Gy)

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部

レジメン名	術前キイトルーダ(1コース6週)	レジメンNo.	35040

対象癌種	1コース日数	催吐リスク
頭頸部癌	42日間	最小度

一般名	標準投与量	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1

内服支持療法		
一般名	標準投与量	投与日

特記事項

StageⅢ、Ⅳの頭頸部癌が対象（cN3b症例、再発病変に対する根治手術症例は対象外）

大阪公立大学医学部附属病院　薬剤部