



C型肝炎に対する インターフェロン治療の 副作用と注意点

最近のインターフェロン治療



インターフェロン
週1回注射




インターフェロン
週1回注射

リバビリン



朝夕食後



インターフェロン
週1回注射



シメプレビル



1日1カプセル

新薬

インターフェロン注射のスケジュールは
若干前後しても治療効果・副作用に影響ありません。

新薬シメプレビルの飲み方 (商品名：ソブリアード)

- ①1日1回 1カプセル
- ②食事の影響を受けないため食後・空腹時どちらの内服でもOK
- ③内服するのを忘れた時は、内服時間から12時間以内ならすぐに内服
- ④治療期間中(24週間)のうち導入から12週間のみ内服


副作用について

治療**初期**に出ることが多い副作用

治療**中期以降**に出ることが多い副作用

治療期間中に出ることが多い副作用

治療初期に出てくる 副作用



発熱・頭痛・関節痛・寒気（インフルエンザ様症状）

解熱鎮痛薬：内服薬・坐薬



皮膚のかゆみ・発疹

抗アレルギー薬：内服薬・塗り薬



食欲不振・吐き気

食事の工夫・水分補給・**内服薬**

治療中期で出てくる 副作用



網膜症
眼の違和感



精神症状
不眠・イライラ感・うつ症状



間質性肺炎
咳や微熱が続く

脱毛

甲状腺機能異常：むくみ・動悸・汗を異常にかく

糖尿病・心臓病の悪化

気になる症状があれば我慢せずに
主治医に報告をしましょう！！



治療中に出てくる副作用

血球成分の減少


ヘモグロビン: 貧血・めまい・立ちくらみ

白血球・好中球:

免疫力の低下(風邪をひきやすい・化膿しやすい)
感染予防(うがい・手洗い・マスクなど)に気をつけて

血小板減少:

出血が止まりにくい(鼻血・歯茎からの出血しやすい)
歯磨き・ひげそりなどは出血に気をつけて



インターフェロン治療と のみ合わせの悪いお薬

かかりつけ薬局を見つけ薬剤師による
のみ合わせのチェックしてもらいましょう

お薬手帳を携帯、他院受診時は
お薬手帳を提示しましょう


健康食品・市販薬も内服前に主治医に
内服可能か確認しましょう！



まとめ

副作用は患者さん個人によって、
出てくる症状・症状の重さが異なります。
出てきた症状は必ず主治医に報告しましょう。

インターフェロン手帳を使って、
体調の管理を記録し、
普段の生活と治療を
快適に送れるようにしましょう。



診察

お薬

生活



運動

食事