L-グルコース資化菌由来 脱水素酵素を利用した電気化学的 LG計測法の開発

2025/04/26

○三浦 大明, 津川若子, 田畑美幸, 浅野竜太郎, 池袋 一典
(東京農工大学大学院 工学府生命工学専攻・生物システム応用科学府)

第2回 L-glucose 研究会
大阪公立大学 医学部 大講堂

TUAT 国立大学法人
東京農工大学
Tokyo University of Agriculture and Technology

東京農工大学
Tokyo University of Agriculture and Technology

● FUCHU campus
Faculty of Agriculture

● KOGANEI campus
Faculty of Engineering

農

工

Biotechnology and Life Science,
生命工学専攻

バイオを使ったものづくり
→ バイオセンサの開発

バイオセンサとは？

バイオセンサとは？

バイオセンサとは？

ChatGPTによるフェルミ推定：
一握の砂 = 10^9 (10億個)

全血 1 mL中

イオン, 低分子 (グルコースなど) : 2.5×10^{19} 個

血球成分 : 5.3×10^9 個

がん関連分子 (ex. 1 nM) : 5.3×10^{11} 個

一握の砂に存在する10粒の砂粒子を探すようなもの...
それを可能にするのが「バイオセンサ」

バイオセンサにおける分子認識素子

相手を捕まえるためのアイテム

核酸アプタマー

酵素

抗体

親和性

$\mu\text{M} \sim \text{nM}$

$\text{mM} \sim \mu\text{M}$

$\mu\text{M} \sim \text{pM}$

標的分子

低分子
～タンパク質

低分子

低分子
～タンパク質

シグナル変換

難

易

難

“DG×酵素”を用いたこれまでのセンサ開発

血糖センサを志向した
グルコースセンシング

I. Lee et al., *Bioelectrochem.*, **121**, 1-6, (2018)

グルコースを燃料
= シグナル変換の起点
とした疾患関連分子
センシング

Miura et al., *Adv. Sci.*, **11**, 2403871, (2024)

Miura et al., *Talanta*, **234**, 122638, (2021)

Komiya et al., *JACS*, **146**, 4087-4097, (2024)

迅速簡便評価系 (すぐに誰でも簡単に) の構築

バイオセンサにおける分子認識素子 相手を捕まえるためのアイテム

核酸アプタマー

酵素

抗体

シグナル変換

難

易

難

異性体識別

報告なし

多数報告

報告なし

**LG迅速簡便評価系を構築するには、
酵素を分子認識素子とすることが最適である！**

Preparation of LguA

発見ベクターは筑波大 中村先生
よりご供与いただきました。

Enzymatic activity of LguA

Condition

Buffer: 50 mM Tris-HCl (pH 8.5) + 1mM NADP
Wavelength: 340 nm (NADPH)
30 sec kinetics

V_{max} : 35 U/mg, K_m : 0.85 mM

V_{max} : 77 U/mg, K_m : 21.5 mM

LGに高い活性を示し、DGにはほとんど反応しなかった

LG電気化学センサの構築 ～検出原理～

流しそめん：位置エネルギーの低い方へ

酵素反応 = 酸化還元反応 = **電子の授受**
電氣的エネルギーの低い方へ電子が渡されていく

13

LG電気化学センサの構築 ～検出原理～

LGの酸化によって生じた電子が、最終的に電流値として測定できる

14

Protocol

酵素反応溶液:

50 mM 電子メディエータ
 0-10 mM 基質
 1 mM NADP⁺
 1.5 U LguA
 20 μ l in total/100 mM P.P.B. (pH 7.0)

1分間反応

10 μ lを微小電極に滴下

1分間断続的に
電流値を測定

15

リン酸緩衝液中のLGの電気化学検出

LG濃度依存的な電流値変化が観察され、0.125-10 mMで高い直線性が確認された。

16

リン酸緩衝液中での特異性評価

17

夾雑物存在下でのLG検出：大腸菌最少培地

Table 2-2-1. L-glucose minimal medium

NH_4Cl	0.54 g	10 mM
KCl	0.52 g	7 mM
$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	0.52 g	2 mM
KH_2PO_4	0.52 g	4 mM
K_2HPO_4	0.53 g	6 mM
K_2HPO_4	1.06 g	13 mM
L-glucose	2.5 g	
*Hutter's trace element solution	2 ml	
1 L (pH 7.0)		

Hutter's trace element solution	液中濃度	培地中濃度
$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	2.2 g	7.65 mM 15 μM
H_3BO_3	1.1 g	0.02 mM 0.04
$\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	1.1 g	2.53 mM 5.0
$\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	0.5 g	1.79 mM 3.6
$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	0.5 g	0.67 mM 1.24
$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	0.16 g	0.64 mM 1.28
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	0.16 g	0.09 mM 0.18
$(\text{NH}_4)_2\text{Mg}_7\text{O}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	0.11 g	
1 L		

Shimizu T, Takaya N, and Nakamura A. J. BIOL. CHEM.OL. 287, NO. 48, pp. 40448-40456, 2012

リン酸緩衝液中と同様にLG濃度依存的な電流値変化が観察された。(0.125-10 mM)

18

今後の予定

培養液実試料中LGの計測

- ・LG資化菌 *Paracoccus laeviglucoosivorans*/最少培地
- ・LGとりこみ能のあるがん細胞/DMEM,FBS

センサの作りこみ

市販の血糖センサのように、試料をセンサに接触させるだけで計測が開始できる、ドライセンサの構築

21

計測ニーズを是非教えて下さい

1. どのような場でどの程度の濃度、解像度でLGを計測できたらよいでしょうか？
2. 試料の量はどの程度でしょうか？
3. LG以外の夾雑物は何でしょうか？

22

謝辞

- 筑波大学 中村顕 先生
- 東京農大 矢嶋俊介 先生

- 弘前大学 山田勝也 先生
- 北海道大学 奥山正幸 先生

- 東京農工大学 薛厚丞さん
小崎千成実さん